

Průvodka k žádance k CT/RTG vyšetření s využitím aplikace JODOVÉ KONTRASTNÍ LÁTKY (JKL)

A. Identifikace pacienta

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

 /

B. Informace k přípravě před CT vyšetřením (indikující lékař vyznačí požadovanou přípravu pacienta)

Nativní CT vyšetření bez přípravy pacienta

(k vyloučení traumatu, vyšetření páteře se zaměřením (mozek k vyloučení organických změn, krk, mediastinum, břicho k vyloučení patologie jater, slinivky, sleziny, ledvin, na ploténky, páteřní kanál a foramina, SI klouby, mozek k vyloučení krvácení a akutní ischemie, paranasální siny, HRCT plic)

Kontrastní CT vyšetření

nadledvin, mízních uzlin, CT angiografie, CT páteře k vyloučení jiných než degenerativních změn)

C. Údaje vyžadované před provedením kontrastního CT/RTG vyšetření

1) Anamnéza středně závažné nebo těžké reakce na JKL

ano, projev reakce

ne

2) Anamnéza alergie vyžadující medikamentózní léčbu

ano, alergen, druh reakce

ne

3) Anamnéza astmatu ano

ne

6) Diabetes mellitus

ano

ne

9) Anamnéza proteinurie ano

ne

4) Hypertyreóza

ano

ne

7) Anamnéza onemocnění ledvin ano

ne

10) Hypertenze

ano

ne

5) Srdeční selhání

ano

ne

8) Předchozí operace ledvin

ano

ne

11) Dna

ano

ne

12) Aktuální hodnota sérového kreatininu (event. GFR) – ne starší než 3 měsíce:

Hodnota:

Datum:

13) Užívá pacient v současné době některý z následujících léků?

Metformin (a jiná peror. Antidiabetika)

Aminoglykosidy

vysazeny 48 h před vyšetřením

Interleukin 2

Betablokátory

Nesteroidní antiflogistika (NSAID)

D. Příprava před aplikací kontrastní látky:

Prostá příprava

• Dostatečný příjem tekutin 1 den před vyšetřením (3 l/den), v den vyšetření před výkonem a po výkonu 1 – 2 dny (také 3 litry / den)

Příprava s podáním kortikoidů (polyvalentní alergie, astma bronchiale, alergie na JKL):

• Pitný režim stejný jako při „prosté přípravě“ – viz výše

• 12 – 18 hodin před vyšetřením (tj. večer cca v 18 h) 2 tbl Prednisonu a 20 mg

• 6 – 9 hodin před vyšetřením (tj. cca ve 3 h ráno) 1 tbl Prednisonu a 20 mg

Příprava závažně alergických pacientů:

• Obvykle začíná již 48 hodin před vyšetřením. Příprava je individuální, za hospitalizace, ve spolupráci s lékařem ARO.

Vyplnil:

Datum, razítko, podpis: